

MS

Penerangan
Arahan in arahah untuk CoFlex T.LC.Zinc dan juga CoFlex T.LC.Zinc Lite.

CoFlex T.LC.Zinc (Standard dan Lite) ialah sistem pemampatan bukan lateks dua langkah. lapisan 1 ialah gunglan biasa dengan zinc yang memberikan keselesaan dan menyerap sahaja. Lapisan 2 ialah pemampatan bahutan legangan regang yang memberikan tambahan tenaga berbasuhan yang diperlukan untuk mengagalkan pengembalian darah yang. Sistem ini direka untuk saling melengk dan memberikan pemampatan pemuliharaan yang berterusan sehingga seragam. Stoking nylon disertakan untuk kemudahan penggunaan dan keselesaan pesakit.

Indikasi Penguaman

CoFlex T.LC.Zinc (Standard dan Lite) direka untuk merawat user kaki vena dan keadaan berkaitan yang lain.

CoFlex T.LC.Zinc (Standard) Ia boleh digunakan untuk pesakit dengan ABI yang lebih besar daripada atau sama dengan 0.8.
CoFlex T.LC.Zinc (Lite) Ia boleh digunakan untuk pesakit dengan ABI yang lebih besar daripada atau sama dengan 0.5.

Kontraindikasi

CoFlex T.LC.Zinc (Standard): ABI kurang daripada 0.8.
CoFlex T.LC.Zinc (Lite): ABI kurang daripada 0.5.


Langkah Berjaga-jaga & Amaran

- Hentikan digunakan di bawah pemampatan pakar penjagaan kesihatan yang berlesen.
- CoFlex T.LC.Zinc (Standard dan Lite) Lapisan 1 dan 2 akan menggantikan pengembalian darah.
- Lapisan 1 CoFlex T.LC.Zinc (Standard dan Lite) bukan pembalut luka yang utama. Ikut protokol yang sewajarnya untuk keadaan luka sebelum menggunakannya.
- Lapisan 2 CoFlex T.LC.Zinc (Standard dan Lite) boleh digunakan pada awalnya dengan pemampatan pesakit menyesuaikan diri atau bertahan dengan sistem pemampatan regangan pemad.
- Pesakit atau penyedia penjagaan kesihatan boleh diatih untuk menggunakan pemalut ini, mengikut buku bicara pakar penjagaan kesihatan.
- Arahan pesakit untuk menghidu ngkat atau jururawat sekiranya mereka mengalami kesakitan, kekejangan, kesemutan, lebam atau jika berikutan bengkak.
- Produkt ini tidak dibat menggunaan loks getah asis.
- Barangan untuk sekali guna.
- Jika kemarahan atau kelegasaan berlaku, hentikan penggunaan.

Arahan Penguaman

Arahan Umum:
Letakkan kaki pada sudut 90°.

- Lapisan 1 - Lapisan Buss:**
- Mula-mula memeriksa di bahagian atas kaki, di pangkal jari keliling kaki dengan teknik lingkaran (rajah 1).
 - Gunakan pemalut dengan cara mengelilingi bahagan atas kaki, kemudian tekan pemalut dengan 1 buntak 8 di sekitar bahagian belkang tumu/buku tali. Pemukaan pemalut lumbi boleh berkesan mengagalkan pengaliran (rajah 2).
 - Teakan pemalut secara melingkar mengikut kaki. Pastikan balutan 50% bertindan mengagalkan ketegangan yang secukupnya untuk disasarkan dengan bentuk kaki, berakih di bawah lutut (rajah 3).
 - Potong atau koyakkan menggunakan tangan bahan yang berlebaran dan tampalkan untuk memastikan balutan dalam keadaan tetap (rajah 4).

**Lapisan 2 - Lapisan Mampatan:**

- Mula-mula membuat Lapisan 2 di bahagian atas kaki, di pangkal jari keliling kaki dengan teknik lingkaran (rajah 3).
- Pegang pemalut dengan buai jari dan regangkan sehingga bentuk bujar menjadi bulatan. Mula-mula membuat secara lingkaran mengitari bahagian atas kaki, kemudian tekan pemalut dengan 1 buntak 8 di sekitar bahagian belkang tumu/buku tali, mematuinya sepenuhnya bahagian tumu dan kaki. Tekanan dengan mengagalkan ketegangan yang sekata dengan mengesan indikasi visual daripada bujur kepada bulatan (rajah 6).

Penujuk visual menyokong penggunaan dan pemampatan yang sepatutnya

- Teakan memalut melingkar kaki mematu Lapisan 1 secara 50% bertindih di samping mengagalkan ketegangan yang sekata (rajah 7).
- Potong atau koyakkan menggunakan tangan bahan yang berlebaran (rajah 8).
- Tekan dengan lembut seluruh bahagian penguaman untuk memastikan tekanan yang seimbang di seluruh kawasan (rajah 9).
- Gunakan stoking nylon di atas sistem untuk kemudahan pergerakan dan keselesaan pesakit ketika mereka kasut dan baju serta ketika berada di bawah cadar (rajah 10).

**Menanggalkan balutan**

CoFlex T.LC.Zinc (Standard dan Lite) boleh ditanggalkan dengan membuka balutan atau dengan gungling pemalut.

Penyimpanan

Untuk hasil yang terbaik, simpan CoFlex T.LC.Zinc (Standard dan Lite) dalam bungkusannya pada suhu bilik sehingga digunakan. Elakkan haba dan kelembapan yang berlebihan. Rajui label pada setiap kotak untuk mendapatkan tarikh luput.

Menyimpan

Untuk hasil yang terbaik, simpan CoFlex T.LC.Zinc (Standard dan Lite) dalam bungkusannya pada suhu bilik sehingga digunakan. Elakkan haba dan kelembapan yang berlebihan. Rajui label pada setiap kotak untuk mendapatkan tarikh luput.

Menanggalkan balutan

CoFlex T.LC.Zinc (Standard dan Lite) boleh ditanggalkan dengan membuka balutan atau dengan gungling pemalut.

Penyimpanan

Untuk hasil yang terbaik, simpan CoFlex T.LC.Zinc (Standard dan Lite) dalam bungkusannya pada suhu bilik sehingga digunakan. Elakkan haba dan kelembapan yang berlebihan. Rajui label pada setiap kotak untuk mendapatkan tarikh luput.

Menyimpan

Untuk hasil yang terbaik, simpan CoFlex T.LC.Zinc (Standard dan Lite) dalam bungkusannya pada suhu bilik sehingga digunakan. Elakkan haba dan kelembapan yang berlebihan. Rajui label pada setiap kotak untuk mendapatkan tarikh luput.

MS

Penerangan
Arahan in arahah untuk CoFlex T.LC.Zinc dan juga CoFlex T.LC.Zinc Lite.

CoFlex T.LC.Zinc (Standard dan Lite) een twestaps niet-latex compressiesysteem. Laag 1 is een schuimrub met zinc die comfort biedt en drainage absorbeert. Laag 2 is een kletselrub met een verstevigd rubber dat de juiste niveau van lengte- en veerkracht biedt en veneseuze terugkeer te bevordert. Dit systeem is ontworpen om aan elkaar te hechten en zorgt voor continue restauratieve compressie gedurende maximaal een week. Een nylon kous is ingebouwd voor gebruiksgemak en comfort voor de patiënt.

Gebruiksindicaties

CoFlex T.LC.Zinc (Standard en Lite) is ontworpen voor de behandeling van veneuze bezwaren en andere geleidelijke aandoeningen.

CoFlex T.LC.Zinc (Standard) kan worden gebruikt voor patiënten met een ABI groter dan of gelijk aan 0,8.
CoFlex T.LC.Zinc (Lite) kan worden gebruikt voor patiënten met een ABI groter dan of gelijk aan 0,5.

Contra-indicaties

CoFlex T.LC.Zinc (Standard): ABI minder dan 0,8.
CoFlex T.LC.Zinc (Lite): ABI minder dan 0,5.

Voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen

- Moet worden gebruikt onder de zorg van een erkende zorgverlener.
- CoFlex T.LC.Zinc (Standard en Lite) Lapisan 1 dan 2 akan menggantikan pengembalian darah.
- Lapisan 1 CoFlex T.LC.Zinc (Standard en Lite) Lapisan 1 dan 2 akan menggantikan pengembalian darah.
- Lapisan 2 CoFlex T.LC.Zinc (Standard en Lite) Lapisan 2 akan menggantikan pengembalian darah.
- Lapisan 2 CoFlex T.LC.Zinc (Standard en Lite) Lapisan 2 akan menggantikan pengembalian darah.
- Lapisan 2 CoFlex T.LC.Zinc (Standard en Lite) Lapisan 2 akan menggantikan pengembalian darah.
- Lapisan 2 CoFlex T.LC.Zinc (Standard en Lite) Lapisan 2 akan menggantikan pengembalian darah.
- Lapisan 2 CoFlex T.LC.Zinc (Standard en Lite) Lapisan 2 akan menggantikan pengembalian darah.
- Lapisan 2 CoFlex T.LC.Zinc (Standard en Lite) Lapisan 2 akan menggantikan pengembalian darah.
- Lapisan 2 CoFlex T.LC.Zinc (Standard en Lite) Lapisan 2 akan menggantikan pengembalian darah.

Gebruiksaanwijzing

Algemene instructies:
Plaats de voet in een hoek van 90°.

- Lapisan 1 - Schuimlaag:**
- Mula-mula memeriksa di bahagian atas kaki, di pangkal jari keliling kaki dengan teknik lingkaran (rajah 1).
 - Gunakan pemalut dengan cara mengelilingi bahagan atas kaki, kemudian tekan pemalut dengan 1 buntak 8 di sekitar bahagian belkang tumu/buku tali. Pemukaan pemalut lumbi boleh berkesan mengagalkan pengaliran (rajah 2).
 - Teakan pemalut secara melingkar mengikut kaki. Pastikan balutan 50% bertindan mengagalkan ketegangan yang secukupnya untuk disasarkan dengan bentuk kaki, berakih di bawah lutut (rajah 3).
 - Potong atau koyakkan menggunakan tangan bahan yang berlebaran dan tampalkan untuk memastikan balutan dalam keadaan tetap (rajah 4).

**Lapisan 2 - Compressielaag:**

- Beginn laag 2 te wikkelen aan de bovenzijde van de voet, aan de basis van het vijfde vifer in een spiraaltechniek (figu 5).
- Houd het verband met de duim vast en trek de ovale cirkels vast. Begin met spiraalvormig wikkelen over de bovenzijde van de voet en wikkel vervolgens twee figuren van 8 rond de achterkant van de hiel/enkel. Het plantare oppervlak van de hiel kan goeddeels zichtbaar zijn (figu 2).
- Ga door met het spiraalvormig wikkelen op de voet. Breek aan het einde van de overlapping van 50% en gebruik het voldoende spanning om zich aan te passen aan de vorm van het been, eindigend net onder de knie (figu 3).
- Snij of scheur overtollig materiaal en tape om het verband op zijn plaats te houden (figu 4).

Visuele indicatoren ondersteunen de toepassing en de beoogde compressie

- Blijf het been spiraalvormig omwikkelen en bedek laag 1 met een overlapping van 50% met behoud van een gelijkmatige spanning (figu 7).
- Snij of scheur overtollig materiaal met de hand (figu 8).
- Druk voorzichtig over de hele oppervlakte op een sterke hechting te waargenem en slinger de vermenigvuldiging (figu 9).
- Gebruik een nylon kous op het systeem voor bewegingsvrijheid en comfort voor de patiënt (figu 10).

**Verwijdering**

CoFlex T.LC.Zinc (Standard en Lite) kan af worden verwijderd door het af te wikkelen of met een verbandschak.

Opvang

CoFlex T.LC.Zinc (Standard en Lite) voor de beste resultaten in de originele verpakking bij kamertemperatuur tot gekoeld. Vermijd overmatige hitte en vochtigheid. Raak het etiket op elke dosis voor de vervaldatum.

Opvang

CoFlex T.LC.Zinc (Standard en Lite) voor de beste resultaten in de originele verpakking bij kamertemperatuur tot gekoeld. Vermijd overmatige hitte en vochtigheid. Raak het etiket op elke dosis voor de vervaldatum.

Opvang

CoFlex T.LC.Zinc (Standard en Lite) voor de beste resultaten in de originele verpakking bij kamertemperatuur tot gekoeld. Vermijd overmatige hitte en vochtigheid. Raak het etiket op elke dosis voor de vervaldatum.

NL

Beschrijving
Deze instructies gelden voor zowel CoFlex T.LC.Zinc als CoFlex T.LC.Zinc Lite.

CoFlex T.LC.Zinc (Standard en Lite) is een twestaps niet-latex compressiesysteem. Laag 1 is een schuimrub met zinc die comfort biedt en drainage absorbeert. Laag 2 is een kletselrub met een verstevigd rubber dat de juiste niveau van lengte- en veerkracht biedt en veneseuze terugkeer te bevordert. Dit systeem is ontworpen om aan elkaar te hechten en zorgt voor continue restauratieve compressie gedurende maximaal een week. Een nylon kous is ingebouwd voor gebruiksgemak en comfort voor de patiënt.

Gebruiksindicaties

CoFlex T.LC.Zinc (Standard en Lite) is ontworpen voor de behandeling van veneuze bezwaren en andere geleidelijke aandoeningen.

CoFlex T.LC.Zinc (Standard) kan worden gebruikt voor patiënten met een ABI groter dan of gelijk aan 0,8.
CoFlex T.LC.Zinc (Lite) kan worden gebruikt voor patiënten met een ABI groter dan of gelijk aan 0,5.

Contra-indicaties

CoFlex T.LC.Zinc (Standard): ABI minder dan 0,8.
CoFlex T.LC.Zinc (Lite): ABI minder dan 0,5.

Voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen

- Moet worden gebruikt onder de zorg van een erkende zorgverlener.
- CoFlex T.LC.Zinc (Standard en Lite) Lapisan 1 dan 2 akan menggantikan pengembalian darah.
- Lapisan 1 CoFlex T.LC.Zinc (Standard en Lite) Lapisan 1 dan 2 akan menggantikan pengembalian darah.
- Lapisan 2 CoFlex T.LC.Zinc (Standard en Lite) Lapisan 2 akan menggantikan pengembalian darah.
- Lapisan 2 CoFlex T.LC.Zinc (Standard en Lite) Lapisan 2 akan menggantikan pengembalian darah.
- Lapisan 2 CoFlex T.LC.Zinc (Standard en Lite) Lapisan 2 akan menggantikan pengembalian darah.
- Lapisan 2 CoFlex T.LC.Zinc (Standard en Lite) Lapisan 2 akan menggantikan pengembalian darah.
- Lapisan 2 CoFlex T.LC.Zinc (Standard en Lite) Lapisan 2 akan menggantikan pengembalian darah.
- Lapisan 2 CoFlex T.LC.Zinc (Standard en Lite) Lapisan 2 akan menggantikan pengembalian darah.
- Lapisan 2 CoFlex T.LC.Zinc (Standard en Lite) Lapisan 2 akan menggantikan pengembalian darah.

Gebruiksaanwijzing

Algemene instructies:
Plaats de voet in een hoek van 90°.


- Lapisan 1 - Schuimlaag:**
- Mula-mula memeriksa di bahagian atas kaki, di pangkal jari keliling kaki dengan teknik lingkaran (rajah 1).
 - Gunakan pemalut dengan cara mengelilingi bahagan atas kaki, kemudian tekan pemalut dengan 1 buntak 8 di sekitar bahagian belkang tumu/buku tali. Pemukaan pemalut lumbi boleh berkesan mengagalkan pengaliran (rajah 2).
 - Teakan pemalut secara melingkar mengikut kaki. Pastikan balutan 50% bertindan mengagalkan ketegangan yang secukupnya untuk disasarkan dengan bentuk kaki, berakih di bawah lutut (rajah 3).
 - Potong atau koyakkan menggunakan tangan bahan yang berlebaran dan tampalkan untuk memastikan balutan dalam keadaan tetap (rajah 4).

**Lapisan 2 - Compressielaag:**

- Beginn laag 2 te wikkelen aan de bovenzijde van de voet, aan de basis van het vijfde vifer in een spiraaltechniek (figu 5).
- Houd het verband met de duim vast en trek de ovale cirkels vast. Begin met spiraalvormig wikkelen over de bovenzijde van de voet en wikkel vervolgens twee figuren van 8 rond de achterkant van de hiel/enkel. Het plantare oppervlak van de hiel kan goeddeels zichtbaar zijn (figu 2).
- Ga door met het spiraalvormig wikkelen op de voet. Breek aan het einde van de overlapping van 50% en gebruik het voldoende spanning om zich aan te passen aan de vorm van het been, eindigend net onder de knie (figu 3).
- Snij of scheur overtollig materiaal en tape om het verband op zijn plaats te houden (figu 4).

Visuele indicatoren ondersteunen de toepassing en de beoogde compressie

- Blijf het been spiraalvormig omwikkelen en bedek laag 1 met een overlapping van 50% met behoud van een gelijkmatige spanning (figu 7).
- Snij of scheur overtollig materiaal met de hand (figu 8).
- Druk voorzichtig over de hele oppervlakte op een sterke hechting te waargenem en slinger de vermenigvuldiging (figu 9).
- Gebruik een nylon kous op het systeem voor bewegingsvrijheid en comfort voor de patiënt (figu 10).

**Verwijdering**

CoFlex T.LC.Zinc (Standard en Lite) kan af worden verwijderd door het af te wikkelen of met een verbandschak.

Opvang

CoFlex T.LC.Zinc (Standard en Lite) voor de beste resultaten in de originele verpakking bij kamertemperatuur tot gekoeld. Vermijd overmatige hitte en vochtigheid. Raak het etiket op elke dosis voor de vervaldatum.

Opvang

CoFlex T.LC.Zinc (Standard en Lite) voor de beste resultaten in de originele verpakking bij kamertemperatuur tot gekoeld. Vermijd overmatige hitte en vochtigheid. Raak het etiket op elke dosis voor de vervaldatum.

Opvang

CoFlex T.LC.Zinc (Standard en Lite) voor de beste resultaten in de originele verpakking bij kamertemperatuur tot gekoeld. Vermijd overmatige hitte en vochtigheid. Raak het etiket op elke dosis voor de vervaldatum.

NO

Beschrijving
Deze instructies gelden voor både CoFlex T.LC.Zinc og CoFlex T.LC.Zinc Lite.

CoFlex T.LC.Zinc (Standard og Lite) er et totrinns kompresjonssystem uten lateks. Lag 1 er en skumrub med zinc som gir komfort og absorber drenering. Lag 2 er en kletselrub med et forsterket gummi som gir riktig nivå av lengde- og veerkracht. Dette systemet er utformet for å både sammen og gi kontinuerlig restaurativ kompresjon i opptil én uke. En nylonstrømpe følger med for brukervenlighet og pasientfortort.

Indikationer for bruk

CoFlex T.LC.Zinc (Standard og Lite) er utformet for å behandle venøse leggsår og andre relaterte tilstander.

CoFlex T.LC.Zinc (Standard) kan brukes til pasienter med en AA1 større enn eller lik 0,8.
CoFlex T.LC.Zinc (Lite) kan brukes til pasienter med en AA1 større enn eller lik 0,5.

Kontraindikasjoner

CoFlex T.LC.Zinc (Standard): AA1 mindre enn 0,8.
CoFlex T.LC.Zinc (Lite): AA1 mindre enn 0,5.

Forsiktighetsregler og advaer

- Bar bruk under direkte av lisensiert helsepersonell.
- Mål ankel-armindeks før påføring.
- CoFlex T.LC.Zinc (Standard og Lite) lag 1 er ikke en primær sårbehandling. Følg passende protokoll for sårtilstanden før påføring.
- Målet er enkle, mindre visuell og anstrengende.
- CoFlex T.LC.Zinc (Standard og Lite) lag 2 kan i utgangspunktet påføres med mindre spenning, slik at pasienten kan tilpasse seg eller tåleren kompresjonssystemet med kort strekk.
- Etter helsepersonells sjekk eller ders omsorgspersoner bli opplyst til å påføre bandasjen.
- Be pasienten kontakte legen eller sykepleier hvis de opplever, nummenhet, prikking, mrsfangelse eller hvis det oppstår hevelse.
- Produktet er ikke laget med naturgummielaks.
- Instruer de pasienten om contacto do nemem com um arts o profissionais de saúde as zij, gaevolished, lirtingen, veikening enveren of als zweiling optreud.
- Produkt is vervaardigd onder natuurlijk rubberelaks.
- Eenmalig gebruik.
- Staak het gebruik in geval van roodheid of irritatie.

Instruksjoner for bruk

Generelle instruksjoner:
Plasser foten i 90° vinkel.

Lag 1 - Skumlag:

- Beginn å pakke lag 1 på toppen av foten, ved basen til den fente tån, i en spiralettikk (figu 1).
- Fortsett spiralettikken oppover beinet, og dekk lag 1 med 50 % overlapp med å pakke 8-figu rundt baksiden av hælen/enkelen. Det plantare overflaten på hælen kan være delvis eksponert (figu 2).
- Fortsett spiralettikken oppover beinet. Påfør med 50 % overlapp ved å bruke akkurat nok spenning til å benets form, og slutt like under kneet (figu 3).
- Kutt eller riv overlapp materialet og tep det fast for å holde bandasjen på plass (figu 4).

**Lag 2 - Kompresjonslag:**

- Beginn å pakke lag 2 på toppen av foten, ved basen til den fente tån, i en spiralettikk (figu 5).
- Hold bandasjen med tommelen og strekk til ovale bitt til sirkler. Beginn spiraltvingning over toppen av foten, og fortsett deretter med å pakke 8-figu rundt baksiden av hælen/enkelen, og dekk hælen og lenda helt. Fortsett å opprettholde jevn spenning ved å strekke de visuelle indikatorene fra ovale til sirkler (figu 6).

Visuelle indikatorer hjelper med påføring og tiltentet kompresjon

- Fortsett å spiraltvinge oppover beinet, og dekk lag 1 med 50 % overlapp mens du opprettholder jevn spenning (figu 7).
- Kutt eller riv av overlapp materialet med de hand (figu 8).
- Druk voorzichtig over de hele påflåttene for å sikre sterk binding og redusere utglidning (figu 9).
- Bruk en nylonstrømpe på systemet for å bevare frihet og komfort for pasienten (figu 10).

**Fjerning**

CoFlex T.LC.Zinc (Standard og Lite) kan fjernes ved å vike den av eller bruke en bandsjeskaks.

Oppbevaring

For best resultat bør oppbevare CoFlex T.LC.Zinc (Standard og Lite) i originalemballasjen ved romtemperatur til den skal brukes. Unngå overdreven varme og fuktighet. Se etiketten på hver forpakning for utelpdato.

Oppbevaring

For best resultat bør oppbevare CoFlex T.LC.Zinc (Standard og Lite) i originalemballasjen ved romtemperatur til den skal brukes. Unngå overdreven varme og fuktighet. Se etiketten på hver forpakning for utelpdato.

Oppbevaring

For best resultat bør oppbevare CoFlex T.LC.Zinc (Standard og Lite) i originalemballasjen ved romtemperatur til den skal brukes. Unngå overdreven varme og fuktighet. Se etiketten på hver forpakning for utelpdato.

Oppbevaring

For best resultat bør oppbevare CoFlex T.LC.Zinc (Standard og Lite) i originalemballasjen ved romtemperatur til den skal brukes. Unngå overdreven varme og fuktighet. Se etiketten på hver forpakning for utelpdato.

Oppbevaring

For best resultat bør oppbevare CoFlex T.LC.Zinc (Standard og Lite) i originalemballasjen ved romtemperatur til den skal brukes. Unngå overdreven varme og fuktighet. Se etiketten på hver forpakning for utelpdato.

Oppbevaring

For best resultat bør oppbevare CoFlex T.LC.Zinc (Standard og Lite) i originalemballasjen ved romtemperatur til den skal brukes. Unngå overdreven varme og fuktighet. Se etiketten på hver forpakning for utelpdato.

Oppbevaring

For best resultat bør oppbevare CoFlex T.LC.Zinc (Standard og Lite) i originalemballasjen ved romtemperatur til den skal brukes. Unngå overdreven varme og fuktighet. Se etiketten på hver forpakning for utelpdato.

Oppbevaring

For best resultat bør oppbevare CoFlex T.LC.Zinc (Standard og Lite) i originalemballasjen ved romtemperatur til den skal brukes. Unngå overdreven varme og fuktighet. Se etiketten på hver forpakning for utelpdato.

Oppbevaring

For best resultat bør oppbevare CoFlex T.LC.Zinc (Standard og Lite) i originalemballasjen ved romtemperatur til den skal brukes. Unngå overdreven varme og fuktighet. Se etiketten på hver forpakning for utelpdato.

Oppbevaring

For best resultat bør oppbevare CoFlex T.LC.Zinc (Standard og Lite) i originalemballasjen ved romtemperatur til den skal brukes. Unngå overdreven varme og fuktighet. Se etiketten på hver forpakning for utelpdato.

Oppbevaring

For best resultat bør oppbevare CoFlex T.LC.Zinc (Standard og Lite) i originalemballasjen ved romtemperatur til den skal brukes. Unngå overdreven varme og fuktighet. Se etiketten på hver forpakning for utelpdato.

Oppbevaring

For best resultat bør oppbevare CoFlex T.LC.Zinc (Standard og Lite) i originalemballasjen ved romtemperatur til den skal brukes. Unngå overdreven varme og fuktighet. Se etiketten på hver forpakning for utelpdato.

Oppbevaring

For best resultat bør oppbevare CoFlex T.LC.Zinc (Standard og Lite) i originalemballasjen ved romtemperatur til den skal brukes. Unngå overdreven varme og fuktighet. Se etiketten på hver forpakning for utelpdato.

Oppbevaring

For best resultat bør oppbevare CoFlex T.LC.Zinc (Standard og Lite) i originalemballasjen ved romtemperatur til den skal brukes. Unngå overdreven varme og fuktighet. Se etiketten på hver forpakning for utelpdato.

Oppbevaring

For best resultat bør oppbevare CoFlex T.LC.Zinc (Standard og Lite) i originalemballasjen ved romtemperatur til den skal brukes. Unngå overdreven varme og fuktighet. Se etiketten på hver forpakning for utelpdato.

Oppbevaring

For best resultat bør oppbevare CoFlex T.LC.Zinc (Standard og Lite) i originalemballasjen ved romtemperatur til den skal brukes. Unngå overdreven varme og fuktighet. Se etiketten på hver forpakning for utelpdato.

Oppbevaring

For best resultat bør oppbevare CoFlex T.LC.Zinc (Standard og Lite) i originalemballasjen ved romtemperatur til den skal brukes. Unngå overdreven varme og fuktighet. Se etiketten på hver forpakning for utelpdato.

Oppbevaring

For best resultat bør oppbevare CoFlex T.LC.Zinc (Standard og Lite) i originalemballasjen ved romtemperatur til den skal brukes. Unngå overdreven varme og fuktighet. Se etiketten på hver forpakning for utelpdato.

Oppbevaring

For best resultat bør oppbevare CoFlex T.LC.Zinc (Standard og Lite) i originalemballasjen ved romtemperatur til den skal